

Aeropax emulsie 10 mg/ml

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Aeropax emulsie 10 mg/ml zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- 1 Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- 2 Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- 3 Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Aeropax emulsie 10 mg/ml en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Aeropax emulsie 10 mg/ml inneemt.
3. Hoe wordt Aeropax emulsie 10 mg/ml ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Aeropax emulsie 10 mg/ml?

Aeropax emulsie 10 mg/ml, emulsie

- 1 Het werkzame bestanddeel is: simeticon. Aeropax emulsie 10 mg/ml bevat simeticon overeenkomend met 10 mg dimeticon per ml emulsie.
- 2 De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: glycerolmonostearaat (E471), polyoxyl 40 steeraat, sorbitol (E420), sorbinezuur (E200), pepermuntolie, microkristallijne cellulose (E460), methylcellulose (E461), natriumcarboxymethylcellulose (E466), natriumsaccharine (E954), gezuiverd water.

Registratiehouder

Sandoz B.V.

Voor inlichtingen en correspondentie

Sandoz B.V.

Postbus 10332

1301 AH Almere

Aeropax emulsie 10 mg/ml, is in het register ingeschreven onder:
RVG 05963, emulsie.

1. WAT IS AEROPAX EMULSIE 10 MG/ML EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

2.

Het werkzame bestanddeel in Aeropax emulsie 10 mg/ml is simeticon. Simeticon behoort tot de groep geneesmiddelen die gasvorming in het maagdarmkanaal verminderen.

Verpakkingen

amberkleurige glazen facons van 100 en 300 ml.

Toepassing

Aeropax emulsie 10 mg/ml kan worden toegepast:

- 1 wanneer grote hoeveelheden lucht zijn ingeslikt;

- 2 bij opgeblazenheid: ophoping van gassen of lucht in maag of darmen, ook indien dit een gevolg is van onjuiste voeding of gebrek aan beweging, bijvoorbeeld bij bedlegerigheid;
- 3 bij opgeblazen gevoel ten gevolge van een ontsteking van de maagwand, een ontsteking van een darmuitstulping of na een operatie;
- 4 vóór onderzoek van de maag (gastroscopie) of röntgenonderzoek van het maagdarmkanaal.

3. WAT U MOET WETEN VOORDAT U AEROPAX EMULSIE 10 MG/ML INNEEMT.

4.

Gebruik Aeropax emulsie 10 mg/ml niet

Als u overgevoelig bent voor simeticon of voor een van de overige bestanddelen.

Wees extra voorzichtig met Aeropax emulsie 10 mg/ml

Wanneer na 14 dagen de klachten nog niet over zijn, dient u uw arts te raadplegen.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Er zijn geen gegevens over het gebruik van simethicon tijdens de zwangerschap, omdat simethicon niet uit het maagdarmkanaal wordt opgenomen, kan Aeropax emulsie 10 mg/ml tijdens de zwangerschap gebruikt worden.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Aangezien simeticon niet wordt opgenomen uit het maagdarmkanaal, mag Aeropax emulsie 10 mg/ml tijdens de periode van borstvoeding gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Aeropax emulsie 10 mg/ml heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of op de bekwaamheid om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Aeropax emulsie 10 mg/ml

Aeropax bevat sorbitol (E420). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Gebruik van Aeropax emulsie 10 mg/ml in combinatie met andere geneesmiddelen

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden. De volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Een wisselwerking kan optreden bij gebruik van Aeropax emulsie 10 mg/ml met:

- 1 laxeermiddelen op basis van minerale olie, zoals paraffine. Hierdoor wordt de werking van Aeropax emulsie 10 mg/ml verminderd.

Wanneer u zulke geneesmiddelen gebruikt, moet u hiermee rekening houden en advies vragen aan uw arts of apotheker.

5. HOE WORDT AEROPAX EMULSIE 10 MG/ML INGENOMEN?

Dosering en wijze van gebruik

Volwassenen

Vóór onderzoek van de maag (gastroscopie) of röntgenonderzoek van het maagdarmkanaal

1 theelepel (5 ml) 4x daags vóór het onderzoek.

Voor andere toepassingen

1-2 theelepels (5-10 ml) 3x daags na de maaltijd en 1-2 theelepels (5-10 ml) voor het slapen gaan.

Kinderen van 12 jaar en ouder

Vóór onderzoek van de maag (gastroscopie) of röntgenonderzoek van het maagdarmkanaal

1 theelepel (5 ml) 4x daags vóór gastroscopie of röntgenonderzoek van het maagdarmkanaal.

Voor andere toepassingen

1 theelepel (5 ml) 3x daags na de maaltijd en 1 theelepel (5 ml) voor het slapen gaan.

Aeropax emulsie 10 mg/ml mag niet worden gebruikt bij kinderen jonger dan 12 jaar, omdat dit geneesmiddel pepermuntolie bevat.

Als u merkt dat Aeropax emulsie 10 mg/ml te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Aeropax emulsie 10 mg/ml heeft ingenomen

Wanneer u te veel van Aeropax emulsie 10 mg/ml heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Aeropax emulsie 10 mg/ml in te nemen

Indien u Aeropax emulsie 10 mg/ml vergeten bent in te nemen, moet u de dosis alsnog innemen. Als u dit ontdekt kort vóór, of op het moment dat u aan de volgende dosering toe bent, moet u de vergeten dosering niet meer innemen, maar gewoon het doseringsschema volgen alsof er niets gebeurd is. Neem nooit een dubbele dosis van Aeropax emulsie 10 mg/ml om zo de vergeten dosering in te halen.

6. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals alle geneesmiddelen kan Aeropax emulsie 10 mg/ml bijwerkingen veroorzaken.

Milde bijwerkingen van Aeropax emulsie 10 mg/ml kunnen zijn:

- 1 misselijkheid
- 2 verstopping

In uitzonderlijke gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden zoals huiduitslag (exantheem), jeuk (pruritis), vochtophoping (oedeem) in het gezicht of in de tong, moeilijkheden met ademen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiters is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

7. HOE BEWAART U AEROPAX EMULSIE 10 MG/ML?

Aeropax emulsie 10 mg/ml buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.

Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Gebruik Aeropax emulsie 10 mg/ml niet meer na de datum vermeld op de verpakking achter "niet te gebruiken na:" of "Exp.:".

Voor alle geneesmiddelen geldt

Oude en overbodige geneesmiddelen kunt u bij de apotheek ter vernietiging afgeven.

Deze bijsluiter is voor het laatst gewijzigd in: mei 2007.

Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis.